

MEDCOAT® CITRUS


Bruksanvisning




1. Dra av folien från applikatorns ovan- och undersida.




2. Tryck tabletten genom öppningen på ovansidan. Se bild 6 för runda och delade tabletter.




3. Fortsätt att trycka tills hela tabletten blivit dragerad. Vänta därefter i fem sekunder.



4. Vrid tabletten två varv utan att dra.



5. Avlägsna tabletten med ett ryck. Svälj tabletten med rekommenderad mängd vatten.



6. Figuren ovan visar hur olika typer av hela och delade tabletter ska tryckas igenom.

SE 2011-10

Ingredienser i MedCoat®:
Sötningsmedel (maltitolsirap), vegetabiliskt fett, surhetsreglerande medel (citronsyra), emulgeringsmedel (sackarosestrar av fettsyror), gelatin, naturligt färgämne (kurkumin), naturliga aromer.

Vad används MedCoat® för?
MedCoat® används för att förse tabletter med ett överdrag som gör tabletter lättare att svälja och ger dem en behaglig smak.

Hur fungerar MedCoat®?
Överdraget blir halt i munnen och innehåller salivstimulerande ämnen vilket tillsammans gör tabletter lättare att svälja. Drageringen kamouflerar även tablettens smak och ger den en ny behaglig smak av citrus. Drageringen löses upp snabbt efter att tabletten har svalts och den innehåller endast livsmedelsklassade ingredienser som inte är kända för att interagera med läkemedel.

Hur används MedCoat®?
Varje applikator (10 st per karta) kan användas för att dragera två små eller en stor tablett. Då endast en tablett skall tas per tillfälle eller vid stora tabletter skall en ny applikator användas för varje dragering. Svälj dragerad tablett tillsammans med rekommenderad mängd vatten kort efter drageringen. MedCoat® kan användas för tabletter och kapslar av olika form och typ som skall sväljas, även för delade tabletter. För bästa resultat använd MedCoat® i rumstemperatur (18-25°C). När en applikator har använts kan den rivas av från kartan.

När ska MedCoat® inte användas?
Använd inte MedCoat® om du är allergisk (överkänslig) mot någon av ingredienserna i MedCoat®. Använd inte MedCoat® med tuggtabletter, tabletter som måste smälta i munnen, tabletter som måste lösas i vatten eller tabletter och kapslar som måste tas med enbart kranvatten. MedCoat® kan användas av barn från och med att de skall börja svälja hela eller delade tabletter. Ofta kan barn lära sig att svälja mindre tabletter från 3-4 års ålder. Observera att inte alla tabletter får delas. Rådgör med din läkare eller med ditt apotek vid osäkerhet.

Hur skall MedCoat® förvaras?
Förvara MedCoat® i rumstemperatur (18-25°C) inuti tillsluten förpackning (påse). Skyddas mot solljus. Förvaras oåtkomligt för barn.

Hållbarhet:
Bäst före datum finns tryckt på baksidan av förpackningen (påsen). Använd MedCoat® inom två månader från det att förpackningen (påsen) öppnats.

Marknadsförs av / Information lämnas av:
Astimex pharma AB
Färögatan 33, SE-164 51 Kista
Tel: 08-588 374 50
Web: www.medcoat.se

Tillverkare:
Med Coat AB, Stockholm, Sverige